Séries numériques

I 1 - Introduction

- a. Définition. Convergence. Divergence.
- b. Série géométrique.

I 2 - Séries à termes réels positifs

- a. Théorèmes de comparaison.
- b. Critère de Riemann.
- c. Critère de d'Alembert et de Cauchy.

I 3 - Séries à termes réels ou complexes

- a. Convergence absolue.
- b. Séries alternées.
- c. Transformation d'Abel.

I 1 a - Définition

Suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow$ **Série** $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ $S_n = \sum_{p=0}^n u_p$

Convergence d'une suite :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$$

Convergence d'une série :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L = \sum_{p=0}^{\infty} u_p$$

Si l est fini la suite est dite convergente sinon divergente

Si L est fini la série est dite convergente sinon divergente

L est la somme de la série.

I 1 1 a : Etudier la suite de terme général

$$u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n} \quad n \geq 1$$

I 1 1 b : Etudier la série de terme général

$$u_n = \frac{1}{n^2} \quad n \geq 1$$

Calculer sa somme.

> **u := n -> 1+(-1)^n / n ;**

$$u := n \rightarrow 1 + \frac{(-1)^n}{n}$$

> **Limit(u(n), n=infinity) : " = value(") ;**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{(-1)^n}{n} = 1$$

> **u := n -> 1 / n^2 ;**

$$u := n \rightarrow \frac{1}{n^2}$$

> **Sum(u(p), p=1..n) : " = value(") ;**

$$\sum_{p=1}^n u_p = -\Psi(1, n+1) + \frac{1}{6} \pi^2$$

$$\Psi(1, n+1) = \Psi(1, n) - \frac{1}{n^2} \quad \text{avec} \quad \Psi(1, 1) = \frac{\pi^2}{6}$$

I 1 b - Série géométrique

La série de terme général

$$u_n = q^n \quad \text{avec } q \in \mathbb{C}$$

admet pour somme des $n+1$ premiers termes

$$S_n = \sum_{p=0}^n q^p = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Conclusion :

Si $|q| < 1$ alors la série $\{q^n\}$
sinon il y a divergence.

converge vers $\sum_{p=0}^{\infty} q^p = \frac{1}{1 - q}$

Nous étudions le cas où $|q| = 1$, soit

$$q = e^{i\theta}$$

> **q := exp(I*theta) : u := n -> q^n :**

> **Sum(u(p), p=0..n) : " = normal(value(")) ;**

$$\sum_{p=0}^n \left(e^{I\theta} \right)^p = \frac{1 - \left(e^{I\theta} \right)^{n+1}}{1 - e^{I\theta}}$$

> **a:=exp(I*theta)-1=exp(I*theta/2)*2*I*sin(theta/2) :**

> **b:=exp(I*theta)^(n+1)-1=exp(I*theta*(n+1)/2)*2*I*sin(theta*(n+1)/2) :**

> **simplify(subs({a, b }, " " ")) ;**

$$\sum_{p=0}^n \left(e^{I\theta} \right)^p = \frac{\sin\left(\frac{1}{2}(n+1)\theta\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\theta\right)} e^{In\theta/2}$$

I 2 a - Théorèmes de comparaison

$$\{u_n \geq 0\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Th1 :

Si $S_n = \sum_{p=0}^n u_p \leq \text{Majorant}$ **alors la série converge.**

Th2 :

Si $\alpha w_n \geq u_n \geq \beta v_n \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha > 0, \quad \beta > 0$

alors

$\{u_n\}$ **converge** $\Rightarrow$ $\{v_n\}$ **converge**

$\{u_n\}$ **diverge** $\Rightarrow$ $\{w_n\}$ **diverge**

I 2 b - Critère de Riemann

$$\{u_n \geq 0\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Th 3 : (Comparaison avec une intégrale)

Si $u_n = f(n)$ où f est une fonction positive, décroissante alors

l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ avec $a \geq 0$

et la série sont de même nature.

Critère de Riemann

$$u_n = \frac{1}{n^\alpha} \quad n \geq 1$$

$\alpha > 1$ la série converge, sinon elle diverge.

- > **u := n -> 1 / n :**
- > **Sum(u(p), p=1..n) : " = value(") ;**

$$\sum_{p=1}^n \frac{1}{p} = \Psi(n+1) + \gamma$$

$$\Psi(n+1) = \Psi(n) + \frac{1}{n} \quad \text{avec} \quad \Psi(2) = \gamma - 1$$

$$\gamma = 0.5772156649 \quad (\text{Euler - Mascheroni})$$

- > **u := n -> 1 / n^alpha :**
- > **Sum(u(p), p=1..infinity) : " = value(") ;**

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^\alpha} = \zeta(\alpha)$$

I 2 a 1 : Nature et somme (éventuelle) des séries

1 -
$$u_n = \frac{1}{n^4} \quad n \geq 1$$

2 -
$$u_n = \frac{2}{n^2 - 1} \quad n \geq 2$$

3 -
$$u_n = \frac{2}{n^3 + 1} \quad n \geq 0$$

> **u := n -> 1 / n^4 :**

> **Sum(u(p), p=1..infinity) : " = value(") ;**

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^4} = \frac{1}{90} \pi^4$$

> **u := n -> 2 / (n^2-1) :**

> **Sum(u(p), p=2..n) : " = value(") ;**

$$\sum_{p=2}^n \frac{2}{p^2 - 1} = -\frac{2}{n+1} - \frac{1}{(n+1)n} + \frac{3}{2}$$

> **u := n -> 2 / (n^3+1) :**

> **Int(u(x), x=0..infinity) : " = value(") ;**

$$\int_0^{+\infty} \frac{2}{x^3 + 1} dx = \frac{4}{9} \pi \sqrt{3}$$

La valeur approchée
de cette série est :
1.686503343

I 2 c - Critère de d'Alembert Critère de Cauchy

$$\{u_n \geq 0\} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Th 4 : (Comparaison avec la série géométrique)

Si $u_n \approx \alpha q^n$ pour n suffisamment grand et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = q.$$

alors

$q < 1$ la série converge

$q > 1$ la série diverge

$q = 1$ la nature est indéterminée

Critère de d'Alembert

Critère de Cauchy

I 2 c 1 : Nature et somme (éventuelle) des séries

1 -
$$u_n = \frac{a^n}{n!} \quad n \geq 0$$

2 -
$$u_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n^2} \quad n \geq 2$$

3 -
$$u_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \, dx \quad n \geq 0$$

- > **`u := n -> a^n / n! :`**
- > **`simplify( u(n+1) / u(n) ) ;`**

$$\frac{a}{n+1}$$

- > **`Sum( u(p), p=0..infinity ) : " = value( " ) ;`**

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{a^p}{p!} = e^a$$

Critère de
D'Alembert

- > **`u := n -> (1-1/n)^(-n^2) :`**
- > **`Limit( u(n+1) / u(n), n=infinity ) : " = value( " ) ;`**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)^2}}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n^2}} = e$$

> **u := n -> a^n / n! :**

**Il faut simplifier un peu l'expression de u(n)
sinon le résultat n'est pas obtenu.**

> **Limit(a*n!^(-1/n), n=infinity) : " = value(") ;**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$$

**Critère de
Cauchy**

> **u := n -> (1-1/n)^(-n^2) :**

> **Limit(u(n)^(1/n), n=infinity) : " = value(") ;**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{1}{n} \right)^{-n^2} \right)^{\frac{1}{n}} = e$$

- > `u := n -> int( sin(x)^(2*n), x=0..Pi/2 ) :`
- > `with(student) :`
- > `intparts(int(cos(x)^2*sin(x)^(2*n-2),
x=0..Pi/2), cos(x)) ;`

Récurrance sur $u(n)$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2n} x}{2n-1} dx$$

Intégrale
de Wallis

- > `rsolve({ v(n)=2*n*v(n-1) / (2*n-1),
v(0)=Pi/2 }, v(n)) ;`

$$\frac{1}{2} \frac{\Gamma(n+1) \pi^{3/2}}{\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}$$

> **convert(" , factorial) :**

> **u := n -> 1 / 2*n! / (n-1/2)!*Pi^(3/2) ;**

$$u := n \rightarrow \frac{1}{2} \frac{n! \pi^{3/2}}{\left(n - \frac{1}{2}\right)!}$$

> **Limit(u(n+1) / u(n), n=infinity) : " = value(") ;**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{n+1}{2n+1} = 1$$

On ne peut conclure, il faut utiliser Raabe - Duhamel

Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = L$$

alors converge pour $L > 1$, sinon diverge.

3 a - Convergence absolue

La série $\{u_n\}$ est AC ssi $\{|u_n|\}$ converge.

Une série convergente mais non absolument est SC.

3 b - Séries alternées

La série $\{u_n = \varepsilon (-1)^n |u_n|\}$ où $\varepsilon = \pm 1$ est dite alternée

Critère :

Une série alternée converge si $|u_n|$ décroît vers 0.

**I 3 b 1 : Etudier la série harmonique
alternée, de terme général**

Exercice

$$u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad \text{avec } n \geq 1$$

> **u := n -> (-1)^(n-1) / n :**

> **Sum(u(p), p=1..infinity) : " = value(") ;**

MAPLE

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{p-1}}{p} = \ln 2$$

I 3 c - Critère d'Abel

Critère :

La série $\{u_n = \alpha_n t_n\}$ est convergente si

$\{\alpha_n\}$ est majorée et $(t_n \geq 0)$ décroît vers 0.

Exemple fondamental :

$$u_n = \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} \text{ avec } \alpha > 0.$$